

Operation for spermatocele (sædbrok)

Hvad er sædbrok?

Sædbrok er en væskeansamling udgået fra bi-testiklen. Det opleves, som om der er 2 eller flere testikler på samme side.

Før operationen

Er du i behandling med børnemagnyl (hjertemagnyl), skal du holde pause hermed i 14 dage inden operationen (magnyl øger tendensen til blødning). Det samme gælder, hvis du spiser fiskeolie eller lignende naturprodukter.

På operationsdagen

Du bør på forhånd have arrangeret transport med et familiemedlem. Du må ikke selv køre bil.

Hvordan foregår operationen?

Der anlægges lokalbedøvelse med indsprøjtning af lokalbedøvelsesmiddel i lysken på samme side som operationen skal foretages, og der suppleres med lidt lokalbedøvelse i huden. Du vil kunne mærke berøring, men ikke smerte.

Operationen foretages gennem et snit i pungen. Væskeansamlingen består af en eller flere "blærer". Blærerne fjernes og udgangspunktet ved bi-testiklen syes sammen.

Hvordan forholder jeg mig efter operationen?

- Et par nettrusser eller tætsiddende underbukser er gode til at støtte pungen. Forbindingen over såret kan fjernes dagen efter operationen.
- Du kan tage brusebad et par dage efter operationen (forsigtigt aftørring).

- Du må ikke tage karbad eller gå i svømmehal/havbad førend såret et helt pænt
- Du skal undgå fysisk anstrengelse i ca. 1 uge, vent til evt. hævelse og ømhed er helt forsvundet.
- Ved smerter kan du tage Panodil tabletter á 500 mg, 2 tabletter maximalt 4 gange per døgn. De kan evt. supplere med Ipren tabletter á 200 mg, 2-3 tabletter 3 gange dgl. (begge kan købes i håndkøb).
- Såret er syet indvendigt i huden med tråd, som opløser sig selv. Der vil ikke være synlige tråde.

Komplikationer

Forekommer sjældent men der kan opstå blødning og infektion.

Hvis pungen hæver voldsomt og bliver blåligt misfarvet, kan det skyldes blødning. Læg dig ned, læg en ispose mod pungen og henvend dig evt. til egen læge eller tlf. 1813.

Evt. infektion vil oftest først vise sig efter nogle dage i form af hævelse, ømhed, rødme og evt. feber. Kontakt egen læge eller tlf. 1813.

På hverdage i dagtid kan klinikken kontaktes på tlf. 45865768.

Det kan i sjældne tilfælde ske, at væskeansamlingen gendannes eller at der dannes en ny, udgået fra et andet sted på bi-testiklen.

Urologisk Specialklinik Hørsholm v/overlæge Henrik Jakobsen
Gl. Hovedgade 14, st.tv
2970 Hørsholm

Telefon: (+45) 45 86 57 68

Email: info@urol.dk

Web: Urol.dk